

Septické komplikácie po gynekologicko-pôrodných operáciách.

Ostró A., Hančíkiovská L.

II.gynekologicko-pôrodná klinika LF UPJŠ Košice

Abstrakt:

Ako pri každom operačnom výkone, rovnako aj pri gynekologických či pôrodných operáciách sa môžu vyskytnúť rozličné komplikácie. Zápalové komplikácie sú pritom jedny z najzávažnejších, často až život ohrozujúcich stavov. Ich vznik v gynekologicko-pôrodnickej operatíve je navyše podmienený aj narušením už fyziologicky kontaminovaného prostredia vagíny či endocervixu, eventuálne infikovaného plodového vajca, či zavedením cudzorodého materiálu. S uplatnením antibiotickej profylaxie ich incidencia v súčasnosti klesla pod 5%.

Infekcie sú najčastejšie polymikrobiálne, tvorené aeróbnou, ale i anaeróbnou flórou. To výrazne sťažuje ich liečbu, ktorá tak musí byť širokospektrálna. Infekčné komplikácie môžu byť rôzneho stupňa od miernych infekcií operačných rán, cez infekciu pošvového pahýľa, endomyometritídu po cisárskom reze, až po septické ako sú septický potrat, nekrotizujúca fascilitída po chirurgickom zásahu na vulve, či septická panvová tromboflebitída, tvorba abscesov v panve (tuboovariálny, pošvového pahýľa, Douglasovho priestoru), až po rozvoj peritonitídy, či sepsy so septickým šokom. Napriek raritnému výskytu sepsy po gynekologicko-pôrodných operáciách je to stále hlavná príčina úmrtí v tomto odbore. Pozornosť by preto mala byť hlavne zameraná na prevenciu takýchto závažných komplikácií, ako sú identifikácia rizikových faktorov, antibiotická profylaxia (cielená antibiotická liečba, minimalizácia času a invazivity výkonov, včasné rozpoznanie rozvíjajúcich sa závažných infekčných komplikácií. Iba tak bude možné znížiť ich prítomnosť na minimum.