

Intraabdominální tlak v péči o kriticky nemocné v chirurgii

Brabec M., Kural T., Novák P., Kulda J.

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Abstrakt:

Cíl: Zhodnocení významu měření intraabdominálního tlaku u kriticky nemocných v chirurgii se zaměřením na těžkou akutní pankreatitidu

Metodika: Retrospektivní hodnocení léčby nemocných s těžkou akutní pankreatitidou, kteří byli hospitalizováni na Chirurgické klinice FN v Plzni nebo Anesteziologicko-resuscitační klinice FN v Plzni v období posledních deseti let.

Výsledky: V uvedeném období bylo na obou klinikách hospitalizováno celkem 311 nemocných s diagnózou těžké akutní pankreatitidy, z toho bylo operováno 96 nemocných (tj. 30,9%), z celkového počtu 311 nemocných 48 pacientů zemřelo (tj. 15,4%). Z celkového počtu 96 operovaných bylo 18 nemocných indikováno k operaci vzhledem k rozvoji břišního kompartment syndromu (ACS).

Závěr: Na příkladu nemocných s těžkou akutní pankreatitidou se snažíme dokázat, že měření intraabdominálního tlaku u kriticky nemocných v chirurgii je metoda jednoduchá a dostupná, je běžnou součástí intenzivní péče a jedná se o nezávislý prediktivní faktor orgánového selhávání. Těto metody lze využít i jako jednoho z faktorů při indikaci k dekompresivní laparotomii u chirurgicky nemocných.